

**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC**

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: [laborator@vnol.cz](mailto:laborator@vnol.cz)**Popis laboratorního vyšetření**

<b>Progesteron</b>	
<b>Analyzovaný materiál</b>	Sérum
<b>Příprava před odběrem</b>	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
<b>Odběrový materiál</b>	<b>Srážlivá krev:</b> Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
<b>Odběr</b>	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
<b>Transport a skladování</b>	<b>Transport:</b> max. 2hod při 16-25°C  <b>Stabilita séra:</b> 2-8°C 10 dní -20°C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Architect Progesterone Abbott Laboratories
<b>Dostupnost</b>	Rutina
<b>Analytická metoda</b>	Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)
<b>Referenční interval</b>	Muži 19 – 115 R 0,0- 0,20 µg/L  Ženy 19 – 115 R 0,0-15,90 µg/L Folikulární fáze 0,0-0,30 Luteální fáze 1,2-15,90 Po menopause 0,0-0,20  Zdroj: Příbalový leták Architect Progesterone Abbott Laboratories
<b>Interpretace</b>	<i>V přípravě</i>
<b>Poznámky</b>	Přepočet jednotek: µg/L x 3,18 = nmol/L

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana