



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Cystatin C (CysC)	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16 -25°C Stabilita séra: 15-25 °C 2 dny 2-8 °C 7 dní -20 °C 1 měsíc Zdroj: Příbalový leták Cystatin C, Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Turbidimetrie
Referenční interval	0 - 1M 1,49 - 2,85 mg/l 1M - 5M 1,01 - 1,92 5M - 1R 0,75 - 1,53 Muži: 1R - 2R 0,77 - 1,85 Ženy: 1R - 2R 0,60 - 1,20 2R - 19R 0,62 - 1,11 Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C. C. Wong et al Muži: 19R - 50R 0,31 - 0,79 mg/l Ženy: 19R - 50R 0,41 - 0,99 mg/l 50R -115R 0,40 - 0,99 mg/l Zdroj: Příbalový leták Cystatin C, Abbott Laboratories

Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana