



**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC**  
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc  
Oddělení klinických laboratoří  
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

### Popis laboratorního vyšetření

| <b>Bilirubin přímý ( konj.Bil )</b> |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Analyzovaný materiál</b>         | Sérum  |
| <b>Příprava před odběrem</b>        | Nejsou stanoveny zvláštní požadavky.<br>R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve  |
| <b>Odběrový materiál</b>            | <b>Srážlivá krev:</b><br>Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml  |
| <b>Odběr</b>                        | R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve  |
| <b>Transport a skladování</b>       | <b>Transport:</b><br>max. 2hod při 16 -25°C<br><br><b>Stabilita séra:</b><br>15-25 °C                      2 dny<br>2-8 °C                         7 dní<br>-20 °C                         3 měsíce<br><br>Zdroj: Příbalový leták Direct Bilirubin, Abbott Laboratories  |
| <b>Dostupnost</b>                   | Rutina, statim   |
| <b>Analytická metoda</b>            | Fotometrie   |
| <b>Referenční interval</b>          | 0       -    15D       5,7 – 12,1 µmol/l<br>15D   -   1R       0,8 – 5,2<br>1R     -   9R       0,8 – 3,4<br>9R     -   13R      0,8 – 5,0<br>Muži: 13R - 19R    1,9 – 7,1<br>Ženy: 13R - 19R    1,7 – 6,7<br>Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C. C. Wong et al<br><br>19R–105R            0,0 – 8,6 µmol/l<br>Zdroj: Příbalový leták Direct Bilirubin Abbott Laboratories |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Interpretace</b> | <i>V přípravě</i> |
| <b>Poznámky</b>     |                   |

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana