



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Transferin - TRF	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16 -25°C Stabilita séra: 15-25 °C 3 dny 2-8 °C 3 dny -20 °C 6 měsíců Zdroj: Příbalový leták Transferrin Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Imunoturbidimetrie
Referenční interval	0 - 11R 2,14 - 3,46 g/l Muži: 11R - 18R 2,42 – 3,75 Ženy: 11R - 18R 2,43 – 4,30 Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C.C.Wong et al. Muži: 18R - 60R 1,74 - 3,64 g/l Ženy: 19R - 60R 1,80 - 3,82 Muži: 60R -105R 1,63 - 3,44 Ženy: 60R -105R 1,73 - 3,60 Zdroj: Příbalový leták Transferrin Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>

Poznámky	
-----------------	--

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana