



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Prealbumin (PREA)	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Srážlivá krev: Vacuette Greiner červená zátka, 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	Transport: max. 2hod při 16 -25°C Stabilita séra: 15–25 °C 1 den 2–8 °C 3 dny -20 °C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Prealbumin Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Turbidimetrie
Referenční interval	0 - 15D 0,02 – 0,12 g/l 15D - 1R 0,05 – 0,24 1R - 5R 0,12 – 0,23 5R - 13R 0,14 – 0,26 13R - 16R 0,18 – 0,31 Muži: 16R – 19R 0,20 – 0,35 Ženy: 16R – 19R 0,17 – 0,33 Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C.C.Wong et al. Muži: 19R - 60R 0,18 – 0,45 g/l Ženy: 19R – 60R 0,16 – 0,38 Muži: 60R -105R 0,16 - 0,42 Ženy: 60R -105R 0,14 – 0,37 Zdroj: Příbalový leták Prealbumin Abbott Laboratories

Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana